


哪些動物會傳染狂犬病？

犬、貓、浣熊、蝙蝠、臭鼬、雪貂、狐狸、鼬獾



如何避免被狗咬？

當狗吃飯、睡覺、照顧小狗不要打擾，不要直視狗目光。



如何避免感染狂犬病？

- 1 赴狂犬病流行地區洽商、旅遊，應避免直接接觸野生及不熟悉的動物及防止蝙蝠進入室內，以減少被哺乳動物咬傷或舔舐傷口之機會。
- 2 飼養之犬、貓，應定期注射動物用狂犬病疫苗，並勿隨意棄養寵物。
- 3 進口動物須經檢疫，切勿走私進口，以防範狂犬病侵入。

被動物咬了怎麼辦？

① 被咬的人部份：

肥皂及清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘快去醫院。



② 咬人的動物：

通知臺中市動物保護防疫處，防疫人員及動物管制員，將傷人的動物留置隔離觀察10天，並採樣送診斷實驗室檢查。



• 臺中市狂犬病預防注射特約動物醫院名冊

請連上<http://animal.taichung.gov.tw/>

• 人用狂犬病疫苗儲備機關

衛生福利部疾病管制署中區管制中心

臺中市南屯區文心南三路20號 (04) 2473-9940

行政院衛生署台中醫院

臺中市三民路一段199號 (04) 2229-4411#2150

童綜合醫院

臺中市梧棲區台灣大道八段699號 (04) 2658-1919#4000

• 人疫情通報及諮詢服務專線1922

<http://www.cdc.gov.tw/>

• 進出口動物檢疫機關

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局

臺中市南區國光路250號 (04) 2285-0198

• 臺中市動物疫情通報服務專線：(04) 23869420

• 臺中市流浪犬捕抓服務專線：(04) 23814978

您不可不知的

狂犬病



臺中市動物保護防疫處

Taichung City Animal Protection and Health Inspection office
www.animal.taichung.gov.tw

什麼是狂犬病？

狂犬病是由病毒引起的一種急性病毒性腦膜腦炎，人類一般是被感染狂犬病的動物咬傷而發病，如未獲適當醫療，死亡率100%，發病時會有焦慮、頭痛、發燒、咬傷部位異樣感、恐水、肌肉麻痺、抽搐等症狀，最後因呼吸麻痺而導致死亡。

狂犬病100%可以預防！

犬貓3月齡以上應施打狂犬病疫苗並每年補強注射1次維持抵抗力。

狂犬病疫苗徽章

施打過狂犬病疫苗的動物皆懸掛榮譽徽章（徽章每年顏色不同，共有藍、黃、綠、紅四色）。



遇到行動怪異的犬隻要小心

疑似狂犬病狗的行動特徵

- 變得容易有侵略性和暴躁



- 變得常常不友善

- 走路姿勢怪異



- 嘴的四周有許多唾液



- 發出跟平常不太一樣的聲音



面對流浪動物把握「二要五不」原則